

OZNÁMENIE

Optimálny termín aplikácie insekticídu voči nymfálnemu štádiu N3 cikády *S.titanus* v čase 07.05.-09.05.2026. Vhodné kombinovať s fungicídom podľa prognózy infekčného rizika hubových patogénov.

Pre Štúrovský región je zvýšené riziko múčnatky, kombinujte insekticíd + anti-múčnatkový fungicíd. Vystríhajte sa kombinácii viac než dvoch látok v tank mixe, môže to znížiť resp. blokovať účinnosť v dôsledku chemických interakcií.

RNDr. Bruno Gabel, CSc.

ÉRTESÍTÉS

A rovarölő szer kijuttatásának optimális időpontja az *S. titanus* kabóca N3 nimfaállapota ellen: 2026.05.07.–05.09.

Javasolt gombaölő szerrel kombinálni a gombás kórokozók fertőzési kockázatának előrejelzése alapján.

A párkányi régióban fokozott a liztharmatveszély, ezért a rovarölő szert liztharmat elleni gombaölő szerrel együtt alkalmazzák. Kerüljék a kettőnél több hatóanyag kombinálását a permetlében (tank mixben), mert a kémiai kölcsönhatások miatt ez csökkentheti vagy akár blokkolhatja a hatékonyságot.

RNDr. Bruno Gabel, CSc.